



Instrucciones y procedimientos para el cuidado preoperatorio: Niños

Nombre del niño: _____

Nombre del médico/teléfono _____

Procedimiento: _____ Fecha: _____ Hora: _____

Preséntese ante: _____ Necesidades especiales: _____

_____ Si hay un cambio en estado general de su niño después que haya recibido las instrucciones preoperatorias (como resfriado, dolor de garganta o fiebre), comuníquese de inmediato con el médico o el cirujano. El médico puede ser contactado a través del operador de buscapersonas de los NIH llamando al (301) 496-1211. Estas enfermedades agudas pueden obligar a que se posponga el procedimiento de su niño.

_____ Su niño no debe comer alimentos sólidos después de la medianoche en la noche anterior a la cirugía o procedimiento (no debe masticar chicle o comer dulces después de medianoche). Esto es muy importante para prevenir complicaciones graves del niño durante el procedimiento.

_____ Se le puede dar leche o leche en polvo hasta 8 horas antes de la cirugía o procedimiento. Si su niño está siendo amamantado, puede ofrecérsele leche de seno hasta 4 horas antes de la cirugía o procedimiento.

_____ Su niño puede tomar líquidos claros (agua, jugo de manzana, paletas heladas o *popsicles*, gelatina simple, es decir, gelatina sin frutas o ingredientes adicionales) hasta 4 horas antes de la cirugía o procedimiento.

_____ Si su niño toma líquidos de una taza para beber del tipo “*sippee*” o de una botella especial para bebés, por favor traiga una con usted.

_____ Por favor infórmele al médico sobre cualquier afección médica que tenga el niño o si está tomando alguna medicina (por ejemplo, trastorno convulsivo, diabetes, presión arterial alta). Por favor informe sobre cualquier otro medicamento o hierbas medicinales que su niño esté tomando actualmente. Estos medicamentos incluyen aspirinas, fármacos antiinflamatorios no esteroideos, AINE (como Motrin, Aleve) y anticoagulantes (como Coumadin). Si su niño usa un inhalador, por favor tráigalo con usted.

- _____ Un padre o un tutor legal debe acompañar al niño al Centro Clínico para dar el consentimiento de que se haga la cirugía o el procedimiento.


- _____ Si un padre o un tutor legal no pueden acompañar al niño al Centro Clínico, un adulto responsable (18 años o más) debe acompañar al niño al Centro Clínico. Los niños pequeños pueden traer un juguete especial o una cobija. Estos objetos pueden ser reconfortantes para los niños cuando se vayan a dormir y cuando se despierten más tarde en la Unidad de Reanimación Postanestesia (PACU, por su sigla en inglés) o sala de recuperación.

- _____ Su niño se sentirá más cómodo vistiendo ropa amplia para ir a casa. Por favor traiga una muda de ropa y de pañales.

- _____ Dígale al personal de enfermería si su niño utiliza lentes de contacto, aparatos dentales o cualquier otra prótesis removible. Éstos serán retirados antes de la cirugía. Por favor traiga un estuche para guardar los lentes de contacto.

- _____ Anticipe que va a quedarse entre 1 a 3 horas después del procedimiento quirúrgico.

- _____ Situaciones inesperadas pueden obligar a que su niño pase la noche en el Centro Clínico. Esto no es probable que suceda, pero ocurre de vez en cuando. Si esto se hace necesario, su médico le explicará las razones de esta inesperada admisión hospitalaria.



2005

Esta información está preparada específicamente para los pacientes que participan en la investigación clínica en el Centro Clínico en los Institutos Nacionales de Salud y no es necesariamente aplicable a los individuos que son pacientes en otra parte. Si tiene alguna pregunta acerca de la información presentada aquí, hable con un miembro de su equipo de atención médica.

¿Tiene preguntas acerca del Centro Clínico? OCCC@cc.nih.gov

En donde sea aplicable, los nombres patentados de productos comerciales se proporcionan solamente como ejemplos ilustrativos de productos aceptables y no implica un respaldo por parte del NIH para dichos productos; ni tampoco el hecho de que el nombre de un producto de patente en particular no se identificó implica que dicho producto no sea satisfactorio.

El Centro Clínico de los
Institutos Nacionales de Salud
Bethesda, MD 20892